

Ce este tuberculoza?


Tuberculoza (TB) este o boală cauzată de germenii care se transmit de la o persoană la alta prin aer. TB afectează de obicei plămâni, dar poate afecta și alte părți ale corpului, cum ar fi creierul, rinichii sau coloana vertebrală.

Cum se transmite boala?

Boala se transmite pe cale aeriană, prin inhalarea microbilor răspândiți în atmosferă de către bolnav atunci când tușește, râde, vorbește, strigă, strănuță, cântă sau scuipă, răspândind în jur particule de salivă.

Cum se manifestă?

Suspiciunea de TB și prezentarea la medic se impune în caz de: tuse care durează mai mult de 3 săptămâni, pierdere în greutate, oboseală, febră (de regulă nu foarte mare), transpirații nocturne, durere toracică, dificultate la respirație, pierderea apetitului, tuse cu expectorație sanguinolentă. Simptomele TB localizate în alte părți ale corpului depind de zona afectată.




Factorii de risc

- fumatul,
- un sistem imunitar slăbit,
- condiții de trai insalubre,
- lipsa unui adăpost,
- încarcerarea,
- rezistență la medicamente.

TB în România, în 2017

S-au înregistrat:

- 14.000 cazuri noi de TB.
- 38 persoane sunt diagnosticate zilnic cu TB.
- 970 decese.
- 300 cazuri noi cu co-infecție HIV TB.
- 720 cazuri noi de TB cu rezistență la medicamente



TB la nivel mondial, conform OMS, în 2018:

TB este una dintre primele 10 cauze de deces la nivel mondial.

Persoanele care trăiesc cu HIV au un risc de 20 până la 30 de ori mai mare de a dezvolta forma de TB activă, comparativ cu cei neinfecțiați cu HIV.

Asocierea HIV și TB este gravă. Fiecare accelerează progresul celeilalte afecțiuni. În 2017, au existat aproximativ 0,9 milioane de cazuri noi de TB printre persoanele HIV pozitive.

TB este principala cauză de deces pentru persoanele cu HIV.

În 2017 au existat 300.000 de decese cauzate de TB în rândul persoanelor cu HIV.

Mortalitatea prin TB a fost de 21 decese %ooo de locuitori în rândul persoanelor HIV pozitive.

În UE s-au înregistrat 12,3 cazuri noi de TB la %ooo de locuitori.

5,9% din cazurile noi de TB au fost raportate la persoanele infectate cu HIV.

În UE, 68,8% dintre cazurile noi de TB aveau status HIV cunoscut.

ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

De ce să prevenim TB?

- TB este o boală tratabilă, însă este o afecțiune complicată, care necesită tratament zilnic, pe o perioadă îndelungată și cu posibile complicații.
- Tratamentul poate avea efecte secundare ceea ce îl poate determina pe pacient să nu își ia medicația zilnic după sfatul medicului, acest fapt determinând complicații ale bolii.

Cum prevenim TB?

- Prin respectarea regulilor de igienă personală (să acopere gura când tușește, să nu scuipe pe jos, etc.) și a locuinței (curățenia curentă, aerisirea încăperilor, expunerea la soare a lenjeriei).
- Evitarea contactului cu persoanele bolnave.
- Vaccinarea nou-născuților care nu împiedică infectarea, dar previne apariția formelor grave de tuberculoză la copilul mic-meningita TB.
- Evitarea consumului de droguri și a fumatului.
- Evitarea stress-ului.
- Alimentație sănătoasă.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

MATERIAL REALIZAT ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI
DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI
EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE AL MINISTERULUI
SĂNĂTĂȚII - PENTRU DISTRIBUȚIE GRATUITĂ



CNEPSS
CENTRAL NATIONAL DE SANATATE SI SANATORIU
SISTEMUL DE SANATATE PUBLICĂ



CENTRUL REGIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI

DSP

**ESTE TIMPUL SĂ
NE PROTEJĂM DE
TUBERCULOZĂ!**

**Oricine se
poate îmbolnăvi
de tuberculoza !**

24 MARTIE 2019

Acest pliant se adresează persoanelor sănătoase

